







**Schema orientativă cu privire la combaterea bolilor,  
dăunătorilor și buruienilor complexate cu nutriție foliară, Cires, vișin**

M. Tomșa, V. Florian, I. Oroian, Monica Porca

Nr. trat.	Agentul de dăunare de combătut	Perioada de executat		Produse de uz fitosanitar recomandate			Observații	
		Fenofaza	Calendari- stic (luna, decada)	Substanța activă	Produs comercial			
					Denumirea	Conc. % Doza l, kg/ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Păduchele din San Jose, ouă de acarieni, bacterioze și boli micotice.	<p align="center">Buton verde</p> 	<p align="center"><b>B</b></p>	<p align="center">III dec.2 – 3</p>	Malation 50 %	Pallas 50 CE sau	1/15	
					Malation 37% +	Carbetox 37CE +		
					Cu 50% sub formă de Cu (OH) 2	Funguran sau alt fungicid pe bază de hidroxid de cupru		0,2/3
2	Idem tr.1	<p align="center">Buton alb</p> 	<p align="center"><b>E</b></p>	<p align="center">IV dec.1</p>	Cupru metalic	Zeamă bordeleză -Cu SO 4 -Var sau	0,7 0,7/10 1,2/18	Tratament facultativ.
					Cu 50 %	Bouille bordelaise	1 / 1.5	
					+ Malation 37%	+ Carbetox	0,4/6	
3	Monilioză, antracnoză, ciuruire.	<p align="center">Începutul înfloririi 50% din flori deschise</p> 	<p align="center"><b>E</b></p>	<p align="center">IV dec.1 – 2</p>	Vinclozolin 250 gr/l + Carbendazim 165 gr/l	Kanker sau	0,15/2,3	Tratament obligatoriu la vișin, îndeosebi când timpul este ploios la înflorit.
					Benomil 50%	Fundazol 50 PU	0.1 / 1.5	
					Tiofanat metil 70%	sau Topsin 70 PU		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	-Antracnoză, ciuruii, monilioză. -Afade, insecte minatoare.	Scuturarea petalelor   G                      H	V dec.1	Carbundazim 50%	Bavistin sau Goldazin 500 EC	0,05/0,8	
				Deltametrin 25 gr./l	+ Decis 2,5EC	0,01/0,15	
				+ Îngrășăminte foliare			
				N-20%, P-20%, K-20% Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo	Master 20-20-20 sau	0,3/5	
				N-20%, P-20%, K-20% B, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn	Patafol 20-20-20 sau		
71	Buruieni mono și dicotiledonate, anuale și perene	Buruienile crescute de 15 – 20 cm	IV, dec. 2, 3	Glifosat 350 g/l	Gliforom RV sau alt erbicid pe bază de glifosat – vezi la măr +	3 – 4	Tehnica de aplicare Vezi la măr
				Oxiflorufen 240 g/l	Galigan 240 EC	3	
				Simazin 50 %	Simadon 50 PU	10	
5	-Ciuruii, monilioză, antracnoză. Păduchele din San Jose, viermele cireșelor.	Intrarea în pârgă a soiului Ramon  I	VI dec.1 – 2	Metil tiofanat 70%	Topsin 70PU sau Fundazol +	0,1/15	
				Benomil 50%		0,1/15	
				Dimetoat 35 %	Sinoratox 35 CE sau	0,15/2,5	
				Malation 50 %	Pallas 50 EC	0,3 / 4	
6	Complexul de boli și dăunători.	După recoltat	VII dec.2 – 3	Cu <sub>2</sub> –50% în Cu(OH) <sub>2</sub>	Funguran +	0,2/3	
				Dimetoat 35%	Sinoratox35CE	0,2/3	
7	Complex de dăunători și boli	60 – 80 din frunze căzute	X dec. 2 – 3 XI dec. I	Cupru metallic 20 %	Bouille bordelaise +	1,2 / 18	
				Quinalfos 30 g/l Ulei mineral	Oleoecalux	1,25 / 19	