





**Schemă orientativă cu privire la combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor la nuc**

M.Tomșa, N. Minoiu, I. Ghizdavu, Elena Tomșa

Nr. trat.	Agentul de dăunare	Perioada de executare		Produsul de uz fitosanitar recomandat			Observații
		Fenofaza	Calendă- ristic luna, decada	Substanța activă	Produs comercial		
					Denumirea	Conc, % Doza l, kg/ha	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene	Buruieni 15 – 20 cm	IV dec.2, 3 V dec.1	Glifosat 360 gr/l +	Roudup +	4	
				Simazin 50%	Simanex 50EC	6	
1	Bacterioza nucului; antracnoza, boala cernelii	Începutul înfrunziturii  D. f. 2	IV dec.3 V dec.1	Hidroxid de Cu - 50% cupru metalic	Funguran OH 50 WP sau Champion 50WP  sau Kocide 101	0,3/4	
2	Antracnoză, bacterioză, molia nucului, viermele nucilor	Uscarea și înnegrirea stigmatelor – G f – legarea fructelor I  F. f2	V dec.3 VI dec.1	Hidroxid de cupru cu 50%  + Deltametrin 25 gr/l	Funguran OH50WP  + Decis 2,5 EC	0,2/4  0,01/0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Buruieni mono și dicotiledonate anuale	Talia buruienilor 5 – 10 cm; rozetă	VI dec. 2 – 3 VII dec.1	Oxifluorfen 240 gr/l	Galigan 240EC Goal 2 E	4	
3	Idem tratamentul 2 plus acarieni	Creșterea drupelor (nucilor) J Lignificarea cojii – K  G. f. J.	VI dec.3 VII dec.1	Mancozeb 80%	Vondozeb 80WP sau	0,3/6	Insecte dacă există.
				Hidroxid de Cu; 50% Cu	Funguran OH50WP	0,2/4	
4	Idem tratamentul 3	Lignificareacomplectă a fructelor, fruct mărire normală – K – L 	VII dec.3	Hidroxid de Cu – 50% Cu	Funguran OH50WP sau	0,2/4	
				Mancozeb 80%	Dithane M45	0,3/6	