






Schema orientativă de combatere a bolilor, dăunătorilor și buruienilor la cultura agrișului și coacăzului

I. Șerba, M. Tomșa, I. Oltean, Carmen Puia

Nr. trat.	Agentul de dăunare	Perioada de executat		Produse de uz fitosanitar recomandate			Obs.
		Fenofaza	Calendari- stic, luna, decada	Substanța activă	Produs comercial		
0	1	2	3	4	5	6	7
					Denumirea	Conc, % doza-1, ha, kg	
1.	Făinarea europeană, făinarea americană, antracnoza, păduchele din San-Jose, afide, acarieni, insecte defoliatoare	Buton verde, începutul înfrunzitului 	III dec.2,3	Metil tiofanat 20%	Topsin 70 PU sau	0,1 / 1	Se utilizează 800-1000 l soluție pe ha.
				Carbendazim 500 g/l	Goldazim 500 SC sau	0,07 / 0,7	
				Clorotalonil 500 g/l	Bravo 500 SC sau	0,2 / 2	
				Benomil 50%	Fundazol 50 WP +	0,1 / 1	
				Malation 37 %	Carbetox 37 CE sau	1 / 10	
				Malation 50 %	Pallas 50 EC sau	0,6 / 6	
				Malation 12,26% + Ulei mineral 40%	Oleocarbetox 12 EC sau	3 / 30	
30% sulf ca polisulfură de bariu	Polibar	1 / 10					
2.	Făinare, antracnoză, afide, țânțarul frunzelor de coacăz, larve defoliatoare	Începutul înfloritului 	IV DEC. 2,3	Carbendazim 50%	Bavistin 50 WP sau Goldazim 50 SC	0,07 / 0,7	
				Metil tiofanat	Topsin PU +	0,07 / 0,7	
				Deltametrin 25 g / l	Decis 2,5 EC sau	0,01 / 0,1	
				Diazinon 60%	Diazol 60 EC sau	0,15 / 1,5	
	Buruieni mono și dicotiledonate anuale și perene		IV DEC.3	Glifosat 360 g/l sau alt erbicid pe bază de glifosat	Gliforom RV sau	4	Se execută cu apărători de rând Galigan 240 EC, se poate aplica și pe rând înainte de deschiderea mugurilor când nu sunt buruieni perene
			Oxiflurofen 240 g / l	Galigan 240 EC sau Goal 2 E	3		

0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Făinări, rugină, antracnoză, țânțarul frunzelor, afide, sfredelitorul tulpinilor de coacăz, acarieni	Majoritatea fructelor legate 	V dec 2,3	Mancozeb 80%	Vondozeb 80 WP sau	0,2 / 2	
				Captan 80%	Merpan 80 WP sau	0,15 / 1,5	
				Clorotalonil 500 g/l	Bravo	0,25/2,5	
				+	+		
				Sulf micronizat	Microtiol special sau	0,3 / 3	
				Sulf 80%	Sulf muiabil 80 PU	0,4 / 4	
				+	+		
				Diazinon 60%	Diazol sau	0,15 / 1,5	
				Quinalfos 160 g/l +	Ecalux S	0,08 / 0,8	
				Tiometon 160 g/l			
				Dimetoat 35%	Sinoratox 35 CE	0,15 / 1,5	
				+	+		
				Amitraz 200 g/l	Bye-Bye 20 EC sau	0,03 / 0,3	
				Cihexatin 600 g/l	Pennstyl 600 FF sau alt acaricid	0,04 / 0,4	
				+ îngrășare foliară			
				N 20%, P20%, K20%, B, Cu, Fe, Mg, Mo, Zn	Patafol 20, 20, 20	0,3 / 3	
				N 20%, P20%, K20%, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn	Master 20, 20, 20	0,3 / 3	

4.	Făinări, rugină, antracnoză, păduchele din San Jose, sfredelitorul tulpinilor, afide, acarienii		VI Dec. 1,2	Captan 50%	Captadin 50 PU sau Merpan 50 PU	0,2 / 2
				Tiofanat metil 70%	+ Topsin 70 PU	0,07 / 0,7
				Quinalfos 160 g/l + Tiometan 160 g/l	+ Ecalux S	0,08 / 0,8
				Dimetoat 35%	Sinoratox 35 CE +	0,15 / 1,5
				Cihexatin 600 g/l	Pennstyl 600 FF	0,04 / 0,4
				Brom propilat	Neoron 500 EC	0,05 / 0,5
5.	Rugină, antracnoză, făinare, păduchele din San Jose, țânțarul fructelor		VII DEC.2,3 VIII dec. 1	Mancozeb 80 %	Vondozeb 80 WP sau	0,2 / 2
				Captan 80 %	Merpan 80 WPG	0,15 / 1,5
				Sulf 80 %	+ Microtiol special sau Sulf muiabil 80 PU	0,3 / 3 0,4 / 4
				Malation 37 %	+ Carbetox 37 CE	0,5 / 5
				Ingrășăminte foliare idem tratamentul nr. 3		