

PROGRAM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA CAIS PHYTOSANITARY PROTECTION PROGRAM FOR APRICOT CULTURE

Murg Silvia¹, Cornelia Ilie¹, Patricia Știrbu², Adelina Dumitraș³
¹S.C.D.P. Oradea, ²DOW AGRO SCIENCES, USAMV Cluj-Napoca

Nr. crt	Faza fenologică sau perioada aplicării	Bolile și dăunătorii de combătut	Denumirea comercială a produsului	Conc. %	Obs.
1.	20-25 nov. După ce 50% din frunze au căzut	<i>Stereum purpureum</i> <i>Monilinia laxa</i> <i>Stigminta carpophila</i> <i>Cytospora cincta</i> <i>Transchelia pruni-spinose</i> <i>Ouă de afide, Acarieni, defoliatoare</i>	Zeamă bordelează (sulfat de cupru + Pastă de var) sau Turdacupral	1 1,0 2,0 0,5	Arătură de toamnă
2.	20-30 martie între umflarea mugurilor și dezmugurit	<i>Ouă de acarieni. Afide</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Grapholita molesta</i> <i>Monilinia laxa</i> <i>Stereum purpureum</i> <i>Stigminta carpophila</i> <i>Cytospora cincta</i>	Oleoekalux 3 ce + Cupritim sau Oleocarbotox + Cuprozir	1,5 0,3 3 0,3	Tăieri de rodire și eliminare ramuri bolnave
3.	10-20 aprilie buton alb	<i>Monilinia laxa</i> <i>Stigminta carpophila</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Grapholita molesta</i> <i>Aphide, defoliatoare</i>	Folicur + Carbotox sau Sumilex + Calypso	0,1 0,4 0,1 0,02	Lucrări sol Montarea capcanelor
4.	20-30 aprilie 10-15% flori scuturate	<i>Monilinia laxa</i> <i>Stigminta carpophila</i> <i>Stereum purpureum</i> <i>Cytospora cincta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Grapholita molesta, afide</i>	Teldor + Sinoratox sau Rovral + Nurelle D	0,05 0,15 0,15 0,075	Observații la capcane Combaterea buruienilor Lucrările solului

0	1	2	3	4	5
5.	5-10 mai scuturarea completă a petalelor	<i>Monilinia laxa</i> <i>Cytospora cincta</i> <i>Stigmata carpophilla</i> <i>Podosphaera</i> sp. <i>Defoliatoare, afide, molii</i> <i>Acarieni</i>	Topsin + Calypso sau Fundazol + Reldan	0,05 0,02 0,1 0,1	Observații la capcane Lucrările solului
6.	20-25 mai fructe cu Ø 0,5 cm	<i>Stigmata carpophilla</i> <i>Cytospora cincta</i> <i>Podosphaera</i> ps. <i>Defoliatoare, afide,</i> <i>Molii, acarieni</i>	Antracol + Karate 2,5 ce sau Captadin + Decis	0,2 0,02 0,2 0,05	Observații la capcane Lucrările solului
7.	5-10 iunie fructe cu Ø cât aluna	<i>Păduchele din San Jose</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Grapholita molesta</i> <i>Afide, acarieni</i> <i>Alternaria</i> sp <i>Stigmata carpophilla</i> <i>Podosphaera</i> sp.	Dithane + Sinoratox sau Vondozeb + Reldan	0,2 0,15 0,2 0,1	Observații la capcane Lucrările solului
8.	20-30 iunie intrarea în părgă	<i>Monilinia laxa</i> <i>Stigmata carpophilla</i> <i>Grapholita molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Păduchele din San Jose</i>	Teldor + Decis sau Folicur + Calypso	0,05 0,05 0,1 0,02	Observații la capcane Combateră buruienilor Lucrările solului
9.	După recoltat	<i>Monilinia laxa</i> <i>Stigmata carpophilla</i> <i>Podosphaera</i> sp <i>Anarsia lineatella</i> Grapholita molesta <i>Afide, acarieni, san jose</i>	Antracol + Carbetox sau Dithane + Sinoratox	0,1 0,4 0,2 0,15	