

PROGRAM DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA PIERSIC PHYTOSANITARY PROTECTION PROGRAM FOR PEACH CULTURE

Murg Silvia¹, Renate Ivănescu¹, Patricia Știrbu², Adelina Dumitraș³
¹S.C.D.P. Oradea, ²DOW AGRO SCIENCES, USAMV Cluj-Napoca

Nr. crt	Faza fenologică sau perioada aplicării	Bolile și dăunătorii de combătut	Produsul recomandat	Conc. %	Obs.
1.	Căderea frunzelor (noiembrie)	Bășicarea frunzelor Ciuruirea micotică și bacteriană Uscarea ramurilor	Turdacupral sau Zeamă bordeleză	0,5 1,0	Arătură de Toamnă
2.	Dezmugurit (martie)	Bășicarea frunzelor Ciuruirea micotică și bacteriană Uscarea ramurilor Oua de acarieni	Capritin + Oleoekalux sau Turdacupral + OleoecarbetoX	0,3 1,5 0,5 3,0	Tăieri de rodire și de eliminare a lăstarilor infecțați cu Monilioză, Făinare, Molii
3.	Buton roz (aprilie)	Bășicarea frunzelor Monilioza Ciuruirea micotică și bacteriană Uscarea ramurilor Molia vârgată (<i>Anarsia</i>)	Zeamă bordeleză + Carbetox sau Cuprozir + Reldan	0,5 0,4 0,3 0,1	Montarea capcanelor Lucrările solului Combaterea buruienilor
4.	10-15 % flori scuturate	Bășicarea frunzelor Monilioza Ciuruirea Molii (<i>Anarsia</i> + <i>Grapholita</i>) Afide, defoliatoare	Vondozeb + Calypso sau Anracol + Decis	0,2 0,02 0,2 0,05	Observații la capcane Lucrări sol Combaterea buruienilor
5.	Fructul cu Ø de 0,5-1 cm	Bășicarea frunzelor Ciuruirea micotică și bacteriană Uscarea ramurilor Molii, afide, defoliatoare	Folpan 50 WP + Ekalux S sau Dithane M45 + Carbetox	0,05 0,05 0,2 0,4	Observații la capcane Lucrări sol

Nr. crt	Faza fenologică sau perioada aplicării	Bolile și dăunătorii de combătut	Produsul recomandat	Conc. %	Obs.
5.	Fructul cu Ø de 0,5-1 cm	Bășicarea frunzelor Ciurirea micotică și bacteriană Uscarea ramurilor Molii, afide, defoliatoare	Folpan 50 WP + Ekalux S sau Dithane M45 + Carbetox	0,05 0,05 0,2 0,4	Observații la capcane Lucrări sol
6.	Fructul cu Ø de 1,5-2 cm (la avertizare)	Ciurirea micotică și bacteriană Făinarea, uscarea ramurilor Bășicarea frunzelor Păduchele din San Jose Molii, afide defoliatoare	Teldor + Decis sau Antracol + Calypso	0,05 0,05 0,2 0,02	Observații la capcane Lucrările solului
7.	Fructul cu Ø 2,5-3 cm (la avertizare)	Ciurirea micotică și bacteriană Făinarea Păduchele din San Jose Molii, afide	Bumper 250 EC + Sinoratox Sau Folpan 50 WP + Carbetox	0,03 0,1 0,3 0,4	Observații la capcane
8.	Fructul de mărime normală Părgă	Monilioza Ciurire Făinare Molii, afide	Rovral 50 WP + Calypso Sau Teldor + Decis	0,1 0,02 0,05 0,05	Observații la capcane Combateră buruienilor
9.	După recoltare	Făinare Boala plumbului Ciurire Molii, acarienii, afide	Bavistin 50 + Sinoratox sau Dithan M 45 + Carbetox	0,1 0,1 0,2 0,4	Lucrările solului