

PROGRAM DE ERBICIDARE ÎN POMICULTURĂ

Adina Perianu

I.C.D.P.Pitești-Mărăcineni

Nr crt	Erbicidul recomandat	Doza (l, kg) soluție/ha	Buruieni de combătut	Moment de aplicare	Cultura pomicolă	Observații
0	1	2	3	4	5	6
1	GALIGAN 240 EC (oxifluorfen 240 g/l)	5 l 300-500 l 4 l 300-500 l	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță și buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță 2-4 frunze, max. 7-10 cm, înălțime și buruieni graminee anuale și unele perene din sămânță numai până în stadiul de 1-2 frunze)	Februarie - martie Preemergent (înainte de rășă- rirea semințelor de buruieni) sau Postemergent timpuriu (plantule)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic Pepiniere C.I, C.II Arbuști fructiferi Căpșun	Grupa IV fără încorporare după tratament, cel puțin 5 mm ploaie; nu se mai mobilizează solul 50-60 zile.
2	GOAL 2XL (oxifluorfen 240 g/l)	5 l 300-500 l 4 l 300-500 l	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță și buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță 2-4 frunze, max. 7-10 cm, înălțime și buruieni graminee anuale și unele perene din sămânță numai până în stadiul de 1-2 frunze)	Februarie - martie Preemergent (înainte de rășă- rirea semințelor de buruieni) sau Postemergent timpuriu (plantule)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic Pepiniere C.I, C.II Arbuști fructiferi Căpșun	Grupa IV fără încorporare după tratament, cel puțin 5 mm ploaie; nu se mai mobilizează solul 50-60 zile.
3	GOAL 2E - RV (oxifluorfen 240 g/l)	5 l 300-500 l 4 l 300-500 l	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță și buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță 2-4 frunze, max. 7-10 cm, înălțime și buruieni graminee anuale și unele perene din sămânță numai până în stadiul de 1-2 frunze)	Februarie - martie Preemergent (înainte de rășă- rirea semințelor de buruieni) sau Postemergent timpuriu (plantule)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic Pepiniere C.I, C.II Arbuști fructiferi Căpșun	Grupa IV fără încorporare după tratament, cel puțin 5 mm ploaie; nu se mai mobilizează solul 50-60 zile.
4	ADOL 80 WP (lenacil 80%)	3,0-3,5 kg	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale din sămânță. (Buruieni cu frunză lată anuale din sămânță)	Februarie - martie Preemergent (înainte de rășă- rirea semințelor de buruieni)	Căpșun	Grupa IV Timp de pauză 28 zile
5	VENZAR 80 WP (lenacil 80%)	3,0-3,5 kg	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale din sămânță. (Buruieni cu frunză lată anuale din sămânță)	Februarie - martie Preemergent (înainte de rășă- rirea semințelor de buruieni)	Căpșun	Grupa IV Timp de pauză 28 zile

0	1	2	3	4	5	6
6	SIMADON 50 PU (simazin 50%)	5 kg 6 kg	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploi 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
7	SIMANEX 50 SC (simazin 500 g/l)	3-3,5 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploi 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
8	SIMANEX 50 WP (simazin 50%)	4,5-5,0 kg	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploi 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
9	SIMANEX 80 WP (simazin 80%)	6,0-8,0 kg	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploi 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
10	SIMANEX 90 WDG (simazin 90%)	1,0 kg 1,5 kg 300-500 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod: măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploi 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
11	DUAL GOLD 960 EC (S-metolacior 960 g/l)	1,2 l 300-500 l apă 1,5 kg 300-500 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i>) și unele <i>dicotiledonate</i> (<i>Amaranthus</i> <i>Chenopodium</i> , <i>Hibiscus</i>)/din sămânță (Buruieni graminee anuale (mohor, iarbă bărbosă, meișor) și unele buruieni cu frunză lată (știr, lobodă porcească, zămoșită) din sămânță.)	Februarie - martie Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Căpșun (pentru fructe și stoloni) Arbuști fructiferi (zmeur, mur, coacăz negru)	Grupa IV Timp de pauză 21 zile Nu se mobilizează solul 60 zile

0	1	2	3	4	5	6
12	STOMP 330 CE (pendimetalin 330 g/l)	5,0 l 300-500 1 apă 4 - 5 l	Buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum halepense</i>) și unele <i>dicotyledonate</i> (<i>Amaranthus</i>) din sămânță (Buruieni graminee (mohor, iarbă băboasă, meișor, costrei) și unele buruieni cu frunză lată (știr) din sămânță)	II-III Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod (măr), Arbuști fructiferi (coacăz) Căpșun	Grupa IV Timp de pauză 21 zile Nu se mobilizează solul 60 zile
13	RV (pendimetalin 330 g/l)	5,0 l 300-500 1 apă 4 - 5 l	Buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i>) unele perene (<i>Sorghum</i>) din semințe și parțial buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale (<i>Amaranthus</i>) din sămânță (Buruieni graminee anuale (mohor, iarbă băboasă, meișor) unele perene (costrei) din sămânță și buruieni cu frunză lată din sămânță (știr)	II-III Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod (măr), Arbuști fructiferi (coacăz) Căpșun	Grupa IV Timp de pauză 21 zile Nu se mobilizează solul 60 zile
14	TREFLAN 48 (triflurolin 480 g/l)	1,5 l-2 l 300-500 1 apă	Buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță.	II-III Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod (măr), Arbuști fructiferi (coacăz) Căpșun Pepinier	Grupa IV Doza în funcție de conținutul în humus, doza maximă la conținut ridicat de humus. Erbucid volatil trebuie încorporat la 20-30 min. după tratament Singurul eficient la secetă. Timp de pauză 30 zile
15	VEGEPRON DS (diuron 165 g/l + simazin 80 g/l)	6-8 l 300-500 1 apă	Buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță.	II-III Preemergent (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	Pomi pe rod (măr),	Grupa IV Nu se încorporează. Nu se mobilizează solul timp de 2 luni.

Se v-a folosi la alegerea unuia din erbicidele preemergente omologate (înainte de răsărirea semințelor de buruieni) calendaristic (februarie - martie).

0	1	2	3	4	5	6
16	GRAMOXONE (paraquat 200 g/l)	3,0-4,0 l 3-3,5 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa III Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
17	BASTA 145 L (glufosinat de amoniu 150 g/l)	5,0 - 6,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
18	DACGLISAT 50 WSG (glifosat acid 50%)	2,5-3 kg 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
19	DOMINATOR (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
20	EFASATE 36 S (glifosat acid 360 g/l)	4,0 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
21	GALLIALKA 36 EC (glifosat 360 g/l)	5,0-6,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
22	GLIFOSAV 480 SL (glifosat ca sare de izopropil amină 480 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Semințose și sâmburoase	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
23	GLYFOS (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Semințose și sâmburoase	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

0	1	2	3	4	5	6
24	GLYFOS BIO (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
25	GLYPHOGAN 480 SL (glifosat din sare IPA 480 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
26	GROUND-UP (glifosat din sare IPA 480 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
27	PILASATO 48 SL (glifosat din sare IPA 480 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
28	ROUNDUP (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
29	SANGLYPHO (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
30	TOUCHDOWN (glifosat trimesium 480 g/l)	4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflori buruieni.
31	TOUCHDOWN SYSTEM 4 (PMG 360 g/l + ion ajutător + surfactant)	4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

0	1	2	3	4	5	6
32	VOLCANO (glifosat sare de IPA 480 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
33	GLFODIM (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
34	CLEAN-UP 480 SL (glifosat sare de IPA 480 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
35	TOM CATO (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
36	AGRO-GLIFO 360 (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
37	PIT BULL (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

Se va folosi la alegere unul din erbicidele postemergente omologate cu substanța activă *glifosat* - erbicid total neselectiv, universal cu acțiune sistemică - comercializat de mai multe firme sub variate denumiri comerciale.

38	CERLIT (fluroxypir 250 g/l)	1,5 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene: <i>Galium</i> , <i>Stellaria</i> , <i>Convolvulus</i> , <i>Galeopsis</i> (Buruieni cu frunză lată anuale (turiță, rocină, volbură, lingurică) și unele perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
----	--------------------------------	---------------------------	--	--	--------------------	---

Singurul erbicid postemergent anticotiledoneic omologat

0	1	2	3	4	5	6
39	FOCUS ULTRA (cicloxiidim 100 g/l)	3,0-4,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și perene inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi (Buruieni graminee anuale și perene inclusiv costrei din rizomi)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
40	SELECT SUPER RV (cletodin 120 g/l)	0,6-1,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i>) și <i>Sorghum</i> - din semințe. (Buruieni graminee anuale (mohor, iarbă bărbosă, meișor) și costrei din semințe)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
41	FUSILADE SUPER (fluazifop-P-butil 125 g/l)	4,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și perene inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi (Buruieni graminee anuale și perene inclusiv costrei din rizomi)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
42	GALLANT SUPER (haloxifop-R-metil 100 g/l)	1,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și perene inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi și <i>Cynodon dactylon</i> din rizomi (Buruieni graminee anuale și perene inclusiv costrei din rizomi și pir gros din rizomi)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
43	LEOPARD 5 EC (quizalofop-P-etil 50 g/l)	1,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> perene: <i>Setaria</i> <i>glauca</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Echinochloa crus-</i> <i>galli</i> (Buruieni graminee anuale)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

Se va folosi la alegere unul din erbicidele postemergente antigramineice omologate.