

## PROGRAM DE ERBICIDARE ÎN POMICULTURĂ - 2005 -

Adina Perianu  
I.C.D.P.Pitești-Mărăcineni

Nr crt	Erbicidul recomandat	Doza (l, kg) soluție/ha	Buruieni de combătut	Moment de aplicare	Cultura pomicolă	Observații
0	1	2	3	4	5	6
1	GALIGAN 240 EC (oxifluorfen 240 g/l)	5 l 300-500 l  4 l 300-500 l	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță și buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță 2-4 frunze, max. 7-10 cm, înălțime și buruieni graminee anuale și unele perene din sămânță numai până în stadiul de 1-2 frunze)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni) sau <b>Postemergent timpuriu</b> (plantule)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic <b>Pepiniere C.I, C.II</b> <b>Arbuști fructiferi</b> <b>Căpșun</b>	Grupa IV fără încorporare după tratament, cel puțin 5 mm ploaie; nu se mai mobilizează solul 50-60 zile.
2	GOAL 2XL (oxifluorfen 240 g/l)	5 l 300-500 l  4 l 300-500 l	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță și buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță 2-4 frunze, max. 7-10 cm, înălțime și buruieni graminee anuale și unele perene din sămânță numai până în stadiul de 1-2 frunze)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni) sau <b>Postemergent timpuriu</b> (plantule)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic <b>Pepiniere C.I, C.II</b> <b>Arbuști fructiferi</b> <b>Căpșun</b>	Grupa IV fără încorporare după tratament, cel puțin 5 mm ploaie; nu se mai mobilizează solul 50-60 zile.
3	GOAL 2E - RV (oxifluorfen 240 g/l)	5 l 300-500 l  4 l 300-500 l	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță și buruieni <i>monocotyledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță 2-4 frunze, max. 7-10 cm, înălțime și buruieni graminee anuale și unele perene din sămânță numai până în stadiul de 1-2 frunze)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni) sau <b>Postemergent timpuriu</b> (plantule)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic <b>Pepiniere C.I, C.II</b> <b>Arbuști fructiferi</b> <b>Căpșun</b>	Grupa IV fără încorporare după tratament, cel puțin 5 mm ploaie; nu se mai mobilizează solul 50-60 zile.
4	ADOL 80 WP (lenacil 80%)	3,0-3,5 kg	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale din sămânță. (Buruieni cu frunză lată anuale din sămânță)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Căpșun</b>	Grupa IV Timp de pauză 28 zile
5	VENZAR 80 WP (lenacil 80%)	3,0-3,5 kg	Buruieni <i>dicotyledonate</i> anuale din sămânță. (Buruieni cu frunză lată anuale din sămânță)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Căpșun</b>	Grupa IV Timp de pauză 28 zile

0	1	2	3	4	5	6
6	SIMADON 50 PU (simazin 50%)	5 kg 6 kg	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploii 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
7	SIMANEX 50 SC (simazin 500 g/l)	3-3,5 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploii 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
8	SIMANEX 50 WP (simazin 50%)	4,5-5,0 kg	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploii 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
9	SIMANEX 80 WP (simazin 80%)	6,0-8,0 kg	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploii 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
10	SIMANEX 90 WDG (simazin 90%)	1,0 kg 1,5 kg 300-500 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță (Buruieni graminee și buruieni cu frunză lată anuale și unele perene din sămânță)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod:</b> măr, păr, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV În funcție de tipul de sol, soluri ușoare, doza mică, soluri grele doza mai mare; eficacitatea sporită, ploii 5 mm în primele două săptămâni după tratament.
11	DUAL GOLD 960 EC (S-metolaclor 960 g/l)	1,2 l 300-500 1 apă 1,5 kg 300-500 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale ( <i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> ) și unele <i>dicotiledonate</i> ( <i>Amaranthus</i> , <i>Chenopodium</i> , <i>Hibiscus</i> ) din sămânță (Buruieni graminee anuale (mohor, iarbă bărboasă, meșor) și unele buruieni cu frunză lată (știr, lobodă porcească, zămoșită) din sămânță.)	Februarie - martie <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Căpșun</b> (pentru fructe și stoloni) <b>Arbuști fructiferi</b> (zmeur, mur, coacăz negru)	Grupa IV Timp de pauză 21 zile Nu se mobilizează solul 60 zile

0	1	2	3	4	5	6
12	STOMP 330 CE (pendimetalin 330 g/l)	5,0 l 300-500 1 apă 4 - 5 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale ( <i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum halepense</i> ) și unele <i>dicotiledonate</i> ( <i>Amaranthus</i> ) din sămânță (Buruieni graminee (mohor, iarbă bărboasă, meișor, costrei) și unele buruieni cu frunză lată (știr) din sămânță)	II-III <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod</b> (măr), <b>Arbuști fructiferi</b> (coacăz) <b>Căpșun</b>	Grupa IV Timp de pauză 21 zile Nu se mobilizează solul 60 zile
13	STOMP 330 EC - RV (pendimetalin 330 g/l)	5,0 l 300-500 1 apă 4 - 5 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale ( <i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> ) unele perene ( <i>Sorghum</i> ) din semințe și parțial buruieni <i>dicotiledonate</i> anuale ( <i>Amaranthus</i> ) din sămânță (Buruieni graminee anuale (mohor, iarbă bărboasă, meișor) unele perene (costrei) din sămânță și buruieni cu frunză lată din sămânță (știr)	II-III <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod</b> (măr), <b>Arbuști fructiferi</b> (coacăz) <b>Căpșun</b>	Grupa IV Timp de pauză 21 zile Nu se mobilizează solul 60 zile
14	TREFLAN 48 (triflurolin 480 g/l)	1,5 l-2 l 300-500 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și unele <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță.	II-III <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod</b> (măr), <b>Arbuști fructiferi</b> (coacăz) <b>Căpșun</b> <b>Pepiniere</b>	Grupa IV Doza în funcție de conținutul în humus, doza maximă la conținut ridicat de humus. Erbicid volatil trebuie încorporat la 20-30 min. după tratament <b>Singurul eficient la secetă.</b> Timp de pauză 30 zile
15	VEGEPRON DS (diuron 165 g/l + simazin 80 g/l)	6-8 l 300-500 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și unele <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene din sămânță.	II-III <b>Preemergent</b> (înainte de răsărirea semințelor de buruieni)	<b>Pomi pe rod</b> (măr),	Grupa IV Nu se încorporează. Nu se mobilizează solul timp de 2 luni.

Se v-a folosi **la alegere unul din erbicidele preemergente omologate** (înainte de răsărirea semințelor de buruieni) calendaristic (februarie - martie).

0	1	2	3	4	5	6
16	GRAMOXONE (paraquat 200 g/l)	3,0-4,0 l 3-3,5 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa III Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
17	BASTA 145 L (glufosinat de amoniu 150 g/l)	5,0 - 6,0 l 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
18	DACGLISAT 50 WSG (glifosat acid 50%)	2,5-3 kg 150-200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
19	DOMINATOR (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
20	EFASATE 36 S (glifosat acid 360 g/l)	4,0 l	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
21	GALIALKA 36 EC (glifosat 360 g/l)	5,0-6,0 l 150- 200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, prun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
22	GLIFOSAV 480 SL (glifosat ca sare de izopropil amină 480 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Semințoase și sâmburoase	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
23	GLYFOS (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 1 apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Semințoase și sâmburoase	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

0	1	2	3	4	5	6
24	GLYFOS BIO (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
25	GLYPHOGAN 480 SL (glifosat din sare IPA 480 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
26	GROUND-UP (glifosat din sare IPA 480 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
27	PILASATO 48 SL (glifosat din sare IPA 480 g/l)	3,0-4,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
28	ROUNDUP (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
29	SANGLYPHO (glifosat 360 g/l)	3,0-4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
30	TOUCHDOWN (glifosat trimesium 480 g/l)	4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflori buruieni.
31	TOUCHDOWN SYSTEM 4 (PMG 360 g/l + ion ajutător + surfactant)	4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate și dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

0	1	2	3	4	5	6
32	VOLCANO (glifosat sare de IPA 480 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe <b>vetre</b> al doilea tratament)	<b>Pomi pe rod</b> Măr, păr, prun, cireș, vișin, cais, piersic	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
33	GLIFODIM (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe <b>vetre</b> al doilea tratament)	<b>Pomi pe rod</b> Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
34	CLEAN-UP 480 SL (glifosat sare de IPA 480 g/l)	3,0 - 4,0 l 150- 200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe <b>vetre</b> al doilea tratament)	<b>Pomi pe rod</b> Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
35	TOM CATO (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe <b>vetre</b> al doilea tratament)	<b>Pomi pe rod</b> Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
36	AGRO-GLIFO 360 (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe <b>vetre</b> al doilea tratament)	<b>Pomi pe rod</b> Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
37	PIT BULL (glifosat acid 360 g/l)	3,0 - 4,0 l 150-200 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> și <i>dicotiledonate</i> anuale și perene. (Buruieni graminee și buruieni cu frunza lată anuale și perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe <b>vetre</b> al doilea tratament)	<b>Pomi pe rod</b> Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

Se v-a folosi la alegere unul din erbicidele postemergente omologate cu substanța activă *glifosat* - erbicid total neselectiv, universal cu acțiune sistemică - comercializat de mai multe firme sub variate denumiri comerciale.

38	CERLIT (fluoxypir 250 g/l)	1,5 l 150-200 l apă	Buruieni <i>dicotiledonate</i> anuale și unele perene: <i>Galium, Stellaria, Convolvulus, Galeopsis</i> (Buruieni cu frunză lată anuale (turiță, rocoina, volbură, lingurică) și unele perene)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe <b>vetre</b> al doilea tratament)	<b>Pomi pe rod</b> Măr	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
----	-------------------------------	---------------------------	---	---	---------------------------	---

Singurul erbicid postemergent antidicotiledoneic omologat

0	1	2	3	4	5	6
39	FOCUS ULTRA (cicloxiđim 100 g/l)	3,0-4,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și perene inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi (Buruieni graminee anuale și perene inclusiv costrei din rizomi)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
40	SELECT SUPER RV (cletodin 120 g/l)	0,6-1,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale ( <i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> ) și <i>Sorghum</i> - din semințe. (Buruieni graminee anuale (mohor, iarbă bărboasă, meișor) și costrei din semințe)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
41	FUSILADE SUPER (fluazifop-P.-butil 125 g/l)	4,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și perene inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi (Buruieni graminee anuale și perene inclusiv costrei din rizomi)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
42	GALLANT SUPER (haloxifop-R-metil 100 g/l)	1,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> anuale și perene inclusiv <i>Sorghum halepense</i> din rizomi și <i>Cynodon dactylon</i> din rizomi (Buruieni graminee anuale și perene inclusiv costrei din rizomi și pir gros din rizomi)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.
43	LEOPARD 5 EC (quizalofop-P-etil 50 g/l)	1,0 l 200-300 l apă	Buruieni <i>monocotiledonate</i> perene: <i>Setaria glauca</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> (Buruieni graminee anuale)	IV-V Postemergent VII-VIII (eventual pe vetre al doilea tratament)	Pomi pe rod Măr Căpșun Arbuști fructiferi	Grupa IV Înălțimea buruienilor 15 - 20 cm în faza creșterii active, până la înflorit buruieni.

Se v-a folosi la alegere unul din erbicidele postemergente antigramineice omologate.